



MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO BRASIL, POR FAIXA DE IDADE, NO PERÍODO DE 2015 A 2019

Leandra Carneiro Bráz¹; Camila Mendes dos Passos²; Juliana Cantele Xavier¹; Iara Pereira da Silva¹; Manuela Martins Cardoso ¹; Maria Eduarda Silva Rosa¹.

¹Graduandos em Enfermagem pelo Departamento de Medicina e Enfermagem na Universidade Federal de Viçosa. E-mails: leandra.braz@ufv.br; juliana.xavier@ufv.br; iara.pereira@ufv.br; manuela.cardoso@ufv.br; maria.e.rosa@ufv.br.

²Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br.

Palavras-chave: Saúde da Mulher; Câncer de Colo do Útero; Mortalidade.

Modalidade: Pesquisa/ **Área de Conhecimento:** Ciências Biológicas e da Saúde/ **Área Temática:** Enfermagem .
 Universidade Federal De Viçosa

Introdução

O câncer cervical é a principal causa de morte por câncer entre mulheres em países em desenvolvimento. Atualmente, é considerado um problema de saúde pública, o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, e há diferenças nas regiões do Brasil. Eles podem ser facilmente identificados pelo exame de Papanicolau encontrado no sistema público de saúde. Se detectados precocemente, os casos de câncer do colo do útero podem ser quase sempre curados e a mortalidade evitada.

Objetivo

Conhecer a mortalidade pelo câncer de colo do útero no Brasil, por faixa etária, no período de 2015 a 2019.

Material e Métodos

- Estudo de série histórica com dados secundários colhidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade do MS/Datasus.

- Dados relacionados ao número de óbitos corridos no Brasil por câncer do colo do útero, no período de 2015 a 2019 foram colhidos no SIM.

- A frequência simples e absoluta foi utilizada para descrever a ocorrência dos óbitos por faixa etária

Resultados

O total de óbitos por câncer de colo do útero foi 31.081. Desses, 2 (0,006%) ocorreram na faixa etária de 10 a 14 anos, 15 (0,04%) na idade de 15 a 19 anos, 851 (2,73%) na idade de 20 a 29 anos, 4105 (13,20%) na idade de 30 a 39 anos, 6075 (19,54%) na idade de 40 a 49 anos, 6779 (21,81%) na idade de 50 a 59 anos, 5968 (19,20%) na idade de 60 a 69, 4365 (14,04%) na idade de 70 a 79 e 2919 (9,39%) na faixa etária de 80 anos ou mais. A maior mortalidade por CA de colo de útero foi evidenciada na faixa etária de 40 a 49 anos. No entanto, na faixa etária de 30 a 59 anos concentra-se mais de 60% dos óbitos por essa causa.

Conclusões

De forma geral, o que se observa é que as mortes causadas pelo câncer de colo de útero, se devem em grande parte à falta de acesso à informação e serviços de saúde de qualidade, o que faz com que o rastreamento não seja realizado de forma efetiva. A prevenção é a forma mais eficiente para combater o câncer de colo de útero e pode ser realizada através de políticas públicas destinadas à conscientização da população sobre a importância do comparecimento às consultas, assim como a vacinação antes do início da vida sexual

Bibliografia

THULE, Luiz Claudio Santos. Mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia , [s. l.], 21 set. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/CgsfzsvTWYZXtjWxMJcz5YQ/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 7 set. 2021.

Apoio