



Simpósio de Integração Acadêmica

“Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”

SIA UFV 2023



Associação entre fatores sociodemográficos e os tipos de parto de mães assistidas pelo Programa de Apoio à Lactação em Viçosa - MG

Autores: Thaís Aneres Castro¹, Sarah Aparecida V. Ribeiro², Amanda Cristina Pereira Fonseca¹, Ana Karoline Santos Vianna³, Nayara Nantes Guerra³, Sylvia do Carmo Castro Franceschini

¹Universidade Federal de Viçosa (UFV), Estudante de Graduação em Nutrição, Viçosa, MG, Brasil, ²Universidade Federal de Viçosa (UFV), Professora adjunta do Departamento de Nutrição e Saúde, Viçosa, MG, Brasil.

³Universidade Federal de Viçosa (UFV), Estudante do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição, Viçosa, MG, Brasil.

Palavras-chave: partos, fatores sociodemográficos, mães, amamentação.

Introdução

O leite materno além de ser o melhor e mais completo alimento para os bebês, traz diversas contribuições para o crescimento e desenvolvimento a longo prazo das crianças e também traz benefícios para a mãe. Hoje no Brasil, temos a segunda maior taxa de cesárea no mundo, aproximadamente 55%, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que a taxa ideal de cesariana deve ser entre 10 a 15% dos partos. Os fatores que influenciam na escolha, seja pela família ou pela equipe médica são diversos, com destaque para as características sociodemográficas e gestacionais.

Objetivos

Associar o tipo de parto aos fatores sociodemográficos e gestacionais em mães atendidas pelo Programa de Apoio à Lactação (PROLAC).

Material e Método

Estudo transversal com 397 prontuários de mães acompanhadas entre os anos de 2003 a 2018 pelo Programa de Apoio à Lactação (PROLAC) em Viçosa - MG. Coletou-se informações sociodemográficas (idade materna, escolaridade, renda) e gestacionais.

A análise estatística foi realizada no *software* SPSS versão 20.0. Para avaliar a associação entre o tipo de parto e variáveis explicativas, aplicou-se os testes Qui-Quadrado de *Pearson* ou *Mann-Whitney*, considerando o nível de significância de 5% ($p < 0,05$).

Resultados e Discussão

- A idade média das mães foi de $26,8 \pm 6,7$ anos e, em sua maioria, adultas (84,8%), com companheiro (72,4%) e com no máximo ensino médio completo (79,7%).
- **69,6%** tiveram parto cesárea .
- A maioria das mães que tiveram parto normal eram adolescentes (43,3%; $p = 0,018$).
- A maioria das mulheres com maior renda (2 a 4 SM), apresentaram parto cesárea ($p = 0,019$).

- A realização do pré-natal particular foi significativamente maior em mães que tiveram parto cesáreo (79,2%) do que naquelas de parto normal (20,8%) ($p=0,004$).

Os resultados mostram a que os níveis sociodemográficos como renda familiar e local de realização do pré-natal, assim como a idade materna, foram fatores associados ao tipo de parto.

Conclusões

- Assim como as taxas mundiais tem apresentado aumento na realização de cesáreas, este estudo analisou e identificou uma proporção aumentada no grupo assistido.
- Todavia, identificando a associação do local de acompanhamento do pré-natal, da renda e da idade materna, sugere-se que mais ações para disseminação de informações, gerando maior autonomia e humanização nesse momento.

Bibliografia

Thompson HR, *et al.* The Relationship between Breastfeeding and Initial Vegetable Introduction with Vegetable Consumption in a National Cohort of Children Ages 1-5 Years from Low-Income Households. *Nutrients*. 2022 Apr 22;14(9):1740. doi: 10.3390/nu14091740.

Ragusa R, Giorgianni G, Marranzano M, Cacciola S, La Rosa VL, Giarratana A, Altadonna V, Guardabasso V. Breastfeeding in Hospitals: Factors Influencing Maternal Choice in Italy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020; 17(10):3575

Casa de Oswaldo Cruz. No Brasil das cesáreas, falta de autonomia da mulher sobre o parto é histórica. 2021

Sitarik AR, Havstad SL, Johnson CC, Jones K, Levin AM, Lynch SV, Ownby DR, Rundle AG, Straughen JK, Wegienka G, Woodcroft KJ, Yong GJM, Cassidy-Bushrow AE. Association between cesarean delivery types and obesity in preadolescence. *Int J Obes (Lond)*. 2020 Oct;44(10):2023-2034. doi: 10.1038/s41366-020-00663-8. Epub 2020 Sep 1.

Agradecimentos

Mães e crianças atendidas pelo PROLAC

Departamento de Nutrição e Saúde/UFV

Hospital São Sebastião e Banco de Leite Humano de Viçosa-MG

Fundação Arthur Bernardes / FUNARBEX - 2023

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFV