

## PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE EM PAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) – PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Autores: Rafael Peres di Peron Borges Paula, Marina Silva de Lucca, Gustavo Antônio de Oliveira, Silva Almeida Cardoso, João Vitor Duncan Viana

Péres, Ana Carolina Lima Bernardo  
ODS 3

Categoria: Pesquisa

### Introdução

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pela presença de sintomas de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade com prejuízos no funcionamento em várias áreas, incluindo nas relações interpessoais intrafamiliares. Filhos com TDAH afetam a saúde mental dos pais e vice-versa. Níveis mais altos de ansiedade têm sido descritos em mães de crianças com TDAH comparadas a mães de crianças sem TDAH.

### Objetivos

Realizar um protocolo de revisão sistemática para investigar a prevalência de ansiedade em pais de crianças com e sem TDAH.

### Metodologia

O protocolo foi escrito seguindo as orientações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA-P) e encaminhado para registro no International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO).

As plataformas definidas para busca foram: Embase, Scopus, BVS, Medline, CADTH e DANS. A estratégia de busca elaborada utilizou o DECS e a combinação dos seguintes termos com operadores booleanos: “Anxiety/neurosis/neurotic/phobia/panic” AND “mother\*/father\*/parent\*” AND (ADHD OR Attention Deficit Hyperactivity disorder”).

A busca incluiu artigos publicados até 2024, sem restrição de idiomas. Os critérios de inclusão foram pais com idade entre 18 e 65 anos e que tenham pelo menos um filho biológico com TDAH com idade entre 5 e 14 anos.

Os critérios de exclusão foram pais com histórico de uso de substâncias, psicose, depressão severa com ideação suicida, deficiência intelectual, doença neurológica grave e filhos adotivos.

Os artigos foram avaliados usando o RAYYAN, aplicativo gratuito que auxilia na organização dos dados e na análise de pesquisas de revisão sistemática e meta-análise. O processo de busca, seleção e extração dos estudos será realizado por dois revisores e em caso de discrepância um terceiro pesquisador auxiliará no processo.

### Apoio Financeiro



### Resultados e/ou Ações Desenvolvidas




Figura 1 – Fluxograma PRISMA-P

### Conclusões

A construção do protocolo minimiza vieses e erros sistemáticos através de um padrão replicável que nos orienta na busca de uma resposta sobre a relação de prevalência da ansiedade nessa população e seu uso futuro na prática clínica.

### Bibliografia

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
- NAGPAL, S. et al. Psychiatric morbidity in the parents of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health*, v. 17, n. 4, p. 30-43, 2021.
- PACHECO, Rafael Leite et al. PROSPERO: base de registro de protocolos de revisões sistemáticas. Estudo descritivo. *Diagnóstico e Tratamento*, São Paulo, v. 23, n. 3, p. 101-104, 2018.
- PAGE, Matthew J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 31, n. 2, e2022107, 2022.
- KUMAR, K. et al. Personification of stress, depression, anxiety, and quality of life, among parents of attention deficit hyperkinetic disorder children. *Indian Journal of Social Psychiatry*, v. 38, n. 2, p. 137-142, 1 abr. 2022.